

Efter forbrænding

Behandling

Du er i dag blevet behandlet for en forbrænding. I dit tilfælde, er behandlingen Gittergaze og tør forbindelse.

Gittergaze modvirker, at yderbandagen hænger fast i såret. Det betyder minimum af smerter i forbindelse med at forbindingen skal skiftes.

Det er vigtigt at forbindingen sidder urørt i 10 dage. Forbindingen må ikke blive våd.

Kontrol

På 10. dagen skal brandsåret kontrolleres hos

- Egen læge
- Plastikkirurgisk ambulatorium på Herlev Hospital, som kan kontaktes på telefon **44 88 39 41**, hverdage mellem kl. 8.30 – 10.00.

Du bedes ringe på førstkommende hverdag, og bestille tid til kontrol på 10. dagen efter ulykken.

Du skal opsøge læge, hvis

- forbindingen forskubber sig
- forbindingen bliver gennemsivet af væske fra såret, eller ved et uheld bliver våd
- der opstår tegn på betændelse
 - tiltagende dunkende smerter i såret
 - forbindingen lugter
 - du får feber

Når brandsåret er helet

Smør et tyndt lag fugtighedscreme på området hver dag i mindst en måned.

Huden på det forbrændte område er meget følsom overfor sol. Undgå derfor sol på det forbrændte område det næste halve år.

Dæk med tøj eller brug solcreme med høj faktor.

Venlig hilsen

**Skadestuen
Kildegårdsvej 28**

Telefon 39 77 37 65