

Sårvejledning

Du har i dag d. / fået
behandlet et sår på

I dit tilfælde er behandlingen

- Steri-Stips, som er en vævsvenlig sårlukningstape, der bruges til at lukke mindre sår og flænger, hvor sårkanterne kan samles med lethed.
- Allevyn adhesiva, en blød bandage, som forebygger, at forbindingen hænger fast i såret.
- Siltex og gazeforbinding. Siltex er et sårkontaktlag, som forebygger, at forbindingen hænger fast i såret
- Tør forbinding eller plaster
- Ingen forbinding

Forbindingen skal skiftes / fjernes på
_____ dagen

- af dig selv
- af egen læge
- hjemmesygeplejerske

Om forbindingen

Det er vigtigt, at forbindingen holdes ren og tør. Hvis forbindingen bliver våd eller gennemsivet, skal den skiftes, da risikoen for betændelse ellers øges.

Når forbindingen skal fjernes, kan det være en god ide forsigtigt at fjerne den yderste forbinding og derefter opløse den inderste bandage i vand, så den lettere løsner sig.

Tegn på betændelse

- Rødme, hævelse og varme omkring såret
- Tiltagende dunkende / bankende smerter
- Gennemsivning af forbindingen
- Ildelugtende forbinding
- Røde striber udgående fra såret
- Feber

Ved tegn på betændelse skal du søge læge.

Vigtigt

Hvis såret sidder på hånden, må du ikke arbejde med madvarer, før såret er helet.

Undgå direkte sol på arret de første 6-12 måneder for at få et pænere ar. Dæk f.eks. med et plaster eller brug solcreme med høj solfaktor.

Venlig hilsen

Skadestuen
Kildegårdsvej 28

Telefon 39 77 37 65

Side 1 af 1
P140014/05-2011/1