

Øjenskade eller øjensygdom

Du er blevet behandlet for en øjenska-
de/øjensygdom og bør derfor være
opmærksom på følgende:

- Hvis øjet er blevet bedøvet, skal du beholde øjenklappen på eller bruge briller i 15 minutter da du ikke kan mærke et evt. fremmedlegeme.
- Har du fået øjenklap på, må du ikke køre bil, da dit synsfelt er halveret.
- Er dit øje blevet farvet, kan der komme lidt gulfarvning fra næsen, næste gang du pudser næse. Det er normalt og helt ufarligt.
- Har du fået dryppet pupiludvidende medicin (Skopolamin) i øjet, er pupillen stor og ude af stand til at trække sig sammen, og det kan være svært at se skarpt med øjet. Udvidelse af pupillen kan vare i op til 5-7 døgn. Så længe pupillen er udvidet, skal du være forsigtig med at køre bil og betjene maskiner. Pupiludvidelsen kan give en trætheds-fornemmelse i øjet. Et godt råd er at bruge solbriller.

Hvordan drypper jeg øjet?

Træk ned i nederste øjenlåg og dryp en dråbe ned i øjet. Luk øjet og blink for at fordele væsken.

Hvordan bruger jeg øjensalve?

Træk ned i nederste øjenlåg og læg en stribe i folden. Luk øjet og fordel salven ved at blinke.

Både øjendråber og øjensalve kan give en medicinsk smag i munden, hvilket er normalt og helt ufarligt.

Undgå smitte med øjenbetændelse

Vær opmærksom på at øjenbetændelse let kan smitte til det andet øje.

Husk derfor:

- At flasken/tuben ikke må komme i berøring med det andet øje.
- Ikke at gnide i øjet – brug en papirserviet hvis øjet løber i vand.
- At vaske hænder, når du har rørt ved øjet.
- At øjendråber/øjensalve skal opbevares i køleskabet og kasseres efter endt behandling.

Vigtigt om kontaktlinser

Du bør undlade at bruge kontaktlinser, så længe du har gener fra dit øje.

Du må aldrig bruge kontaktlinser samtidig med, at du bruger øjendråber eller øjensalve.

Venlig hilsen

Skadestuen
Kildegårdsvej 28

Telefon 39 77 37 65